

- Blutentnahme stelle gequetscht										
Unsichtbar verunreinigte Blutflecken	0	0	0	0	0	0	+	-	-	0
-Filterpapier vor oder nach der Probennahme mit Fingern angefasst										
-Filterpapier mit Stuhl verunreinigt										
Zu viel Probenmateri- al, „gelackte“ Blutflecken	+	+	-	+	+	-	+	-	0	0
-mehrere Blutstropfen übereinander aufgetragen										
-Kreise von Vorder- und Rückseite befüllt										
EDTA-, Heparin-, Citrat-Blut	0	0	0	+	-	0	-	+	+	0

Abnahmezeitpunkt zu früh	-	-	0	+	+	0	+	+	0	+
BE unmittelbar nach Gabe von Bluttransfusionen/ FFP	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
Corticosteroid-Therapie des Kindes	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Catecholamingabe des Kindes	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
Pivmecillinam	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allopurinol Alloxanthin Oxypurinol	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0
Acetylcystein	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0
Azathioprin	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0
Gabapentin	+	+	0	0	0	0	0	0	0	0
Triamteren	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0
Levetirazepam	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pregabalin	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Jodkontaminat ion*	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0

*Kontrastmittelgabe bei der Mutter bis zu ½ Jahr zurückliegend,
Thyreostatika- Medikation der Mutter überdosiert,
jodhaltige Desinfektionsmittel unter der Geburt